


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора
Департамента лекарственного
обеспечения и медицинской техники
Министерства здравоохранения
Кыргызской Республики
Джанкорозова М.К.

«30» августа 2019 г.



ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

АНАКОСИНУМ (Anacosinum)

Торговое название
АНАКОСИНУМ

Международное непатентованное название нет

Лекарственная форма
Гранулы

Состав на 1 флакон

Активные вещества: Борец клубочковый 5С, Экстракт печени и сердца барбaryской утки 200С, Ластовень лекарственный 5С, Белладонна 5С, Медь 3С, Эхинацея узколистная 3С, Инфлюзинум 9С

Вспомогательные вещества: лактоза, сахароза.

Описание

Белые или беловато гладкие сферические гранулы во флаконах.

Фармакотерапевтическая группа

Гомеопатическое средство.

Фармакологические свойства

Экстракт печени и сердца барбaryской утки стимулирует клеточно-опосредованный иммунный ответ (главным образом цитотоксические Т-лимфоциты и естественные киллеры), направленный на клеточный лизис.

Инфлюзинум в гомеопатическом виде активирует иммунную систему и индуцирует клеточный ответ (макрофаги, цитотоксические Т-лимфоциты и естественные киллеры). Инфлюзинум синергизирует действие экстракта печени и сердца барбaryской утки.

Ластовень лекарственный стимулирует активность Th1 - лимфоцитов (Интерферон гамма).

Борец клубочковый применяют как болеутоляющее средство при невралгиях и ревматических поражениях.

Белладонна оказывает противовоспалительное действие, сокращает производство слизи в пазухах носа, очищает дыхательные пути от избыточной мокроты. Эффект Белладонны на дыхательную систему делает его эффективным средством для некоторых аллергических реакций, особенно при сенной лихорадке.

Эхинацея узколистная обладает свойствами природного антибиотика, мягко стимулирует иммунную систему (увеличивает количество лейкоцитов и усиливает активность Т-лимфоцитов) и предотвращает развитие острых респираторных вирусных инфекций и инфекционных заболеваний бронхолегочной системы:

Медь известна своей антагонической активностью (модуляция реакции на стимулятор простагландинов).

Показания к применению

- высокая температура, озноб, усталость, боль в теле при простудных заболеваниях и гриппе.

Способ применения и дозировка

Внутрь.

Взрослым и детям старше 2-х лет:

Для профилактики: 1 флакон в неделю в период сезонного гриппа

При появлении симптомов: по 1 флакону 3 раза в день каждые 6 часов.

Передозировка

Сведений об отрицательных эффектах передозировки не имеется.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Сведений о взаимодействии препарата с другими лекарственными средствами не имеется.

Срок годности

5 лет с даты изготовления.

Форма выпуска

6 флаконов с гранулами по 1 г каждый, упакованных в 2 коробки по 3 флакона.

Условия хранения

Хранить в сухом и защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель

Бхаргава Фитолаб ПВТ. ЛТД.
Е-1216, Фейз-1, Экстеншин, Гхатал,
Бхивади Индастриал Эрия,
Бхивади (Радж.) ИНДИЯ
E-mail : export@bhargavaphytolab.com
Website : www.bhargavaphytolab.com